

Ασκήσεις στην Ισότητα Τριγώνων

4ο Φύλλο Εργασίας

Καθηγητής: Νικόλαος Δ. Κατσίπης

Συνέπειες των κριτηρίων ισότητας τριγώνων

• Στο ισοσκελές τρίγωνο:

- * Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.
(Πόρισμα I, σελίδα 42)
- * Η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι διάμεσος και ύψος.
(Πόρισμα I, σελίδα 42)
- * Η διάμεσος που αντιστοιχεί στη βάση του είναι ύψος και διχοτόμος.
(Πόρισμα I, σελίδα 45)
- * Το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση του είναι διάμεσος και διχοτόμος.
(Πόρισμα I, σελίδα 50)

• Στον κύκλο:

- * Αν δύο τόξα είναι ίσα, τότε και οι χορδές τους είναι ίσες και αντίστροφα.
(Πόρισμα IV, σελίδα 42, Πορίσματα III, IV, σελίδα 46)
- * Δύο χορδές είναι ίσες αν και μόνο αν τα αποστήματα τους είναι ίσα.
(Θεώρημα III, σελίδα 51)
- * Ο φορέας του αποστήματος μιας χορδής:
 - είναι μεσοκάθετος της χορδής,
 - διχοτομεί το αντίστοιχο τόξο της χορδής.
(Πόρισμα II, σελίδα 50)

• Ιδιότητα διχοτόμου γωνίας:

- * Κάθε σημείο της διχοτόμου μια γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της.
- * Κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές της ανήκει στη διχοτόμο της.

(Θεώρημα εν Ι'', σελίδα 51)

• Ιδιότητα μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος:

- * Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του.
- * Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθύγραμμου τμήματος ανήκει στη μεσοκάθετό του.

(Πόρισμα III, σελίδα 42, Πόρισμα II, σελίδα 45)

Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ).
 - (α') Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι παραπληρωματικές.
 - (β') Ένα αιμοβλυγόνιο τρίγωνο δεν μπορεί να είναι ισοσκελές.
 - (γ') Οποιαδήποτε δύο τρίγωνα, που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία, είναι ίσα.
 - (δ') Οποιαδήποτε δύο τρίγωνα, που έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, είναι ίσα.
 - (ε') Οποιαδήποτε δύο ορθογώνια τρίγωνα, που έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία, είναι ίσα.
 - (ζ') Σε δύο οποιαδήποτε τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες.
 - (η') Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο το ύψος που άγεται από οποιαδήποτε κορυφή είναι διχοτόμος της αντίστοιχης γωνίας και διάμεσος της απέναντι πλευράς.
 - (η') Αν M είναι σημείο της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος AB , τότε $MA = MB$.
 - (θ') Αν δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες, τότε και τα αποστήματα τους είναι ίσα.
 - (ι') Η διχοτόμος μιας γωνίας είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας.

Ασκήσεις

1. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABG ($AB = AG$) και τα σημεία Δ, E των πλευρών AB, AG αντίστοιχα, τέτοια, ώστε $B\Delta = GE$.
Αν το σημείο M είναι το μέσο του ΔE , να αποδείξετε ότι:
 - (α') το τρίγωνο BMG είναι ισοσκελές,
 - (β') τα τρίγωνα $AM\Delta$ και AME είναι ίσα.
2. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABG ($AB = AG$), $A\Delta$ το ύψος του και O τυχαίο σημείο του $A\Delta$.
 - (α') Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο BOG είναι ισοσκελές.
 - (β') Αν E, Z είναι τα μέσα των OB και OG αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $AE = AZ$.
3. Θεωρούμε γωνία $x\widehat{O}y$ και δύο κύκλους (O, ρ) , (O, R) , με $\rho < R$. Αν ο πρώτος κύκλος τέμνει τις πλευρές Ox, Oy στα σημεία A, B , ο δεύτερος στα Γ, Δ και M είναι το σημείο τομής των $A\Delta$ και $B\Gamma$, να αποδείξετε ότι:


Η άσκηση 3 δίνει
έναν τρόπο
κατασκευής της
διχοτόμου μιας
γωνίας.

- (α') τα τρίγωνα $O\Delta\Delta$ και $O\Delta\Gamma$ είναι
ίσα,

- (β') τα τρίγωνα $M\Delta\Gamma$ και $M\Delta\Delta$ είναι
ίσα,


- (γ') τα τρίγωνα $O\Delta M$ και $O\Gamma M$ είναι
ίσα,

- (δ') η OM είναι η διχοτόμος της $x\widehat{O}y$.



4. Το τρίγωνο ABG του παρακάτω σχήματος είναι ισοσκελές με $AB = AG$.
Επίσης, $A\Delta = AE$ και M είναι το μέσο της πλευράς BG .

Αν η προέκταση του ΔM τέμνει την προέκταση της πλευράς AG στο σημείο H και η προέκταση του EM τέμνει την προέκταση της πλευράς AB στο σημείο Z , να αποδείξετε ότι:




- (α') τα τρίγωνα ΔMB και EMG είναι
ίσα,
(β') τα τρίγωνα ZBM και HGM είναι
ίσα,
(γ') το τρίγωνο AZH είναι ισοσκελές.

5. Από εξωτερικό σημείο Σ του κύκλου (K, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣAB και $\Sigma \Gamma \Delta$ του κύκλου για τις οποίες ισχύει $\Sigma B = \Sigma \Delta$. Τα $K\Lambda$ και KM είναι τα αποστήματα των χορδών AB και $\Gamma \Delta$ του κύκλου αντίστοιχα.

- (α') Να αποδείξετε ότι:

- i. τα τρίγωνα $KB\Sigma$ και $K\Delta\Sigma$ είναι ίσα,

- ii. $K\Lambda = KM$.



- (β') Να αιτιολογήσετε γιατί οι χορδές AB και $\Gamma \Delta$ είναι ίσες.

“Ο Αρχιμήδης θα μνημονεύεται, όταν ο Αισχύλος θα έχει ξεχαστεί, γιατί, ενώ οι γλώσσες πεθαίνουν, οι μαθηματικές ιδέες είναι διαχρονικές.”

Godfrey Harold Hardy, 1877-1947, Αγγλος μαθηματικός.